

28

Centro eruttivo: Bue Marino

Località: Scoglio del Notaro (costa NO)

Fm. del Bue Marino

Prodotti del II stadio evolutivo dell'isola di Filicudi

La superficie affiorante dello scoglio mette in evidenza una struttura poligonale risultante dalla sezione basale di una fessurazione colonnare.



# GEOSITI DELLE ISOLE EOLIE

Alicudi-Filicudi



## Macrosistema

- \* Non definito
- \* Prodotti del III stadio evolutivo dell'isola di Alicudi
- \* Prodotti del IV stadio evolutivo dell'isola di Alicudi
- \* Prodotti del II stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Terrazzi di abrasione marina antichi (post II stadio evolutivo) di Filicudi
- \* Prodotti del III stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Prodotti del IV stadio evolutivo dell'isola di Filicudi
- \* Sistema vulcanico La Canna-Montenassari di Filicudi
- \* Prodotti vulcanici dello stadio di Paleo-Panarea
- \* Manifestazioni dello stadio idrotermale del vulcanismo di Panarea
- \* Prodotti del vulcanismo degli Scogli vicini a Panarea
- \* Prodotti dello stadio intermedio dell'attività vulcanica di Panarea
- \* Prodotti dello stadio finale dell'attività vulcanica di Panarea
- \* Vulcaniti della Fossa di Vulcano
- \* Vulcaniti del II stadio evolutivo di Stromboli (Paleo-Stromboli)
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del IV stadio evolutivo (I Vancori) di Stromboli
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del V stadio evolutivo di Stromboli (Neo-Stromboli)
- \* Centri eruttivi e vulcaniti del VI stadio evolutivo di Stromboli (Stromboli Recente)

- Geosito areale
- Altri elementi presenti nel geosito areale

## ZONA RISERVA NATURALE

- A
- B

1:10.000

